



### CONTENIDO MÍNIMO EN BOTIQUÍN

- AGUA OXIGENADA
- ALCOHOL
- ALGODÓN
- ANALGÉSICOS
  - ACIDO ACETILSALICILICO (ASPIRINA)
  - PARACETAMOL (TERMALGÍN o ALGIDOL)
- ANTISÉPTICO Povidona Yodada
- ESPARADRAPO
- GASAS ESTÉRILES
- PINZAS Y TIJERAS
- TIRITAS
- VENDAS
- GUANTES DESECHABLES
- BANDA DE GOMA para contener hemorragias
- Además, en LABORATORIOS:
  - Si no existe fuente lavaojos:
    - SUERO FISIOLÓGICO
    - LINITUL

### RECOMENDACIONES EN EL USO DEL BOTIQUÍN

- Los medicamentos se utilizarán siempre de forma racional
- No se utilizará material del botiquín fuera del ámbito laboral
- Tras hacer uso del material de botiquín dejar los envases cerrados y en su sitio
- El material de botiquín será exclusivo de primeros auxilios
- Verificar la fecha de caducidad de los productos antes de utilizarlos
- Al agotar existencias avisar a:
  - Secretaría de cada Departamento, o
  - Conserjería del Edificio, o
  - SERVICIO DE PREVENCIÓN: ext. 9505**, donde se atenderá su petición de material y cualquier duda o aclaración.

### NORMAS PARA EL USO DEL BOTIQUÍN

**HERIDAS:** Lavarse las manos con agua y jabón antes de actuar, lavar la herida y secar con gasa estéril, aplicar antiséptico y cubrir con un apósito.

**HEMORRAGIAS:** Aplicar gasa en el punto sangrante y efectuar compresión directa sobre ese punto.

**LIPOTIMIA:** Colocar a la persona tumbada con las piernas ligeramente elevadas.

**QUEMADURAS:** Lavar con agua abundante la zona y cubrir con gasa estéril.

**INHALACIÓN DE GASES:** Sacar al accidentado al aire libre y realizar reanimación respiratoria en caso de que no respire.

**SALPICADURAS EN LOS OJOS:** Lavar con agua corriente durante 15 minutos, tapar con gasa estéril y acudir al médico.