

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Pruebas de Acceso a la Universidad (L.O.G.S.E.)

Curso 2006-07

Convocatoria: Septiembre

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

El alumno contestará a los ejercicios de una de las dos propuestas (A o B) que se le ofrecen. Nunca deberá contestar a ejercicios de una propuesta y a ejercicios distintos de la otra. Es necesario justificar las respuestas.

Se permite el uso de calculadoras científicas siempre que no sean programables ni gráficas. Si algún alumno es sorprendido con una calculadora no autorizada, podrá ser expulsado del examen; en todo caso, se le retirará la calculadora sin que tenga derecho a que le proporcionen otra.

Tiempo: Una hora y media.

PROPUESTA A:

1.- (1,5 puntos) Obtener, en función de a , b y c , el determinante de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+c & 1 \end{pmatrix}.$$

2.- (1,5 puntos) Calcula


$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{sen} x}{\tan x - \operatorname{sen} x}.$$

3.- (1 punto) Busca algún criterio que te permita afirmar que la ecuación $x^3 + x^2 - 7x + 1 = 0$ tiene al menos una solución en el intervalo $(0, 1)$. ¿Qué te dice ese criterio para el intervalo $(-1, 0)$? Razona la respuesta.

4.- (3 puntos) Halla una primitiva de la integral $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^3}} dx$ que se anule en $x = 0$.

5.- (3 puntos) Averigua para qué valor de m la recta $r \equiv \begin{cases} x + 2y + 5z = m \\ 2x - y - z = -2 \end{cases}$ se corta con la recta $s \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-4}{5}$.

Calcula el coseno del ángulo que forman ambas rectas.



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Pruebas de Acceso a la Universidad (L.O.G.S.E.)
Curso 2006-07
Convocatoria: Septiembre
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

El alumno contestará a los ejercicios de una de las dos propuestas (A o B) que se le ofrecen. Nunca deberá contestar a ejercicios de una propuesta y a ejercicios distintos de la otra. Es necesario justificar las respuestas.

Se permite el uso de calculadoras científicas siempre que no sean programables ni gráficas. Si algún alumno es sorprendido con una calculadora no autorizada, podrá ser expulsado del examen; en todo caso, se le retirará la calculadora sin que tenga derecho a que le proporcionen otra.

Tiempo: Una hora y media.

PROPUESTA B:

1.- (1,5 puntos) Obtener, en función de a , b y c , el determinante de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+c & 1 \end{pmatrix}.$$

2.- (1,5 puntos) Calcula

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{sen} x}{\tan x - \operatorname{sen} x}.$$


3.- (1 punto) Busca algún criterio que te permita afirmar que la ecuación $x^3 + x^2 - 7x + 1 = 0$ tiene al menos una solución en el intervalo $(0, 1)$. ¿Qué te dice ese criterio para el intervalo $(-1, 0)$? Razona la respuesta.

4.- (3 puntos) Halla el área limitada por la curva $y = xe^{-x^2}$, el eje de abscisas, y la recta $x = a$, siendo a la abscisa del punto máximo de la curva.

5.- (3 puntos) Determina a y b para que los planos

$$x + y + z = 2, \quad 2x + 3y + z = 3, \quad ax + 10y + 4z = b$$

se corten en una recta r . Da algún tipo de ecuaciones para r (las que quieras).



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Pruebas de Acceso a la Universidad (L.O.G.S.E.)
Curso 2006-07
Convocatoria: . Septiembre
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

(1) Se sugiere un tipo de corrección positivo, es decir, partiendo de cero y sumando puntos por los aciertos que el alumno vaya obteniendo.

(2) Como excepción al apartado anterior, los errores muy graves, del tipo

$$\sqrt{a^2 + b^2} = a + b, \quad \frac{\ln x}{x} = \ln, \quad \int \frac{x}{x^2 + 3} = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{3} \right),$$

se penalizarán especialmente, y pueden suponer un 0 en el apartado en el que se hayan cometido.

(3) Se deberá valorar la exposición lógica y la coherencia de las respuestas, tanto en cuestiones teóricas como prácticas. Algunos ejemplos:

- (a) Si al resolver un sistema de ecuaciones, el alumno comete un error **numérico**, y el desarrollo posterior es coherente con dicho error, no se prestará especial atención siempre y cuando el problema no haya quedado reducido a uno trivial.
- (b) En la representación gráfica de funciones, se valorará la coherencia del dibujo con los datos obtenidos previamente por el alumno. (Vale aquí la misma excepción que en el párrafo anterior.)

(4) La puntuación máxima que se puede obtener en cada ejercicio viene señalada en la copia del examen que se entrega al alumno. Si alguno de los apartados tiene a su vez subapartados, se deberá distribuir razonablemente el número de puntos entre los mismos (no necesariamente debe darse el mismo peso a cada subapartado).

(5) Si un alumno da una respuesta acertada a un problema escribiendo sólo los resultados, sin el desarrollo lógico de cómo los ha obtenido, la puntuación en este apartado no podrá ser superior al 40 % de la nota máxima prevista.

(6) La calificación será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio de una sola propuesta.