




LV Olimpiada Matemática Española

Primera Fase

Primera sesión

Viernes tarde, 18 de enero de 2019



1. Sea $p \geq 3$ un número primo y consideramos el triángulo rectángulo de cateto mayor $p^2 - 1$ y cateto menor $2p$. Inscribimos en el triángulo un semicírculo cuyo diámetro se apoya en el cateto mayor del triángulo y que es tangente a la hipotenusa y al cateto menor del triángulo. Encuentra los valores de p para los cuales el radio del semicírculo es un número entero.

2. ¿Existen m, n enteros positivos de forma que

$$n^2 + 2018mn + 2019m + n - 2019m^2$$

es un número primo?

3. Fijamos un número natural $k \geq 1$. Encuentra todos los polinomios $P(x)$ que cumplan

$$P(x^k) - P(kx) = x^k P(x)$$

para todo valor de $x \in \mathbb{R}$.

**No está permitido el uso de calculadoras.
Cada problema se puntúa sobre 7 puntos.
El tiempo de cada sesión es de 3 horas y media.**




LV Olimpiada Matemática Española

Primera Fase

Segunda sesión

Sábado mañana, 19 de enero de 2019



4. Se considera el conjunto de números enteros positivos n cumpliendo que $1 \leq n \leq 1000000$. En ese conjunto, indica si es mayor la cantidad de números que pueden expresarse de la forma $a^3 + mb^2$, con $a, b \in \mathbb{N}$ y $m \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$ o la cantidad de números que no pueden expresarse de esa manera.

5. Prueba que para todo $a, b, c > 0$ se cumple que

$$\frac{a^2}{b^3c} - \frac{a}{b^2} \geq \frac{c}{b} - \frac{c^2}{a}$$

¿En qué caso se cumple la igualdad?

6. Consideramos un triángulo ABC y un punto D en el lado AC . Si $\frac{AB}{DC} = 1$, $\angle DBC = 30^\circ$ y $\angle ABD = 90^\circ$, calcula el valor de $\frac{AD}{AC}$.

**No está permitido el uso de calculadoras.
Cada problema se puntúa sobre 7 puntos.
El tiempo de cada sesión es de 3 horas y media.**